

PROTEGEZ-VOUS DU COVID, FACE AU VARIANT BQ.1.1

Nos conseils pour les personnes sévèrement immunodéprimées

1. SOYEZ À JOUR DE VOS RAPPELS


Un rappel de vaccin bivalent est recommandé :

- trois mois après la dernière injection ou après une infection
- quel que soit le nombre de doses reçues auparavant.



> VOS PROCHES DOIVENT AUSSI RECEVOIR CE RAPPEL

dès six mois après leur dernière injection.



Ni une sérologie ni une ordonnance ne sont nécessaires pour recevoir ce nouveau rappel

OBTENIR UN RDV DE RAPPEL
Après de votre pharmacien, de votre médecin généraliste, etc.

On peut avoir un taux d'anticorps très élevé sans pour autant être protégé !

Testez-vous sans attendre en cas de symptôme !

Nez qui coule, toux, fatigue anormale, maux de tête, etc.

2. RECEVEZ EVUSHELD EN PRÉVENTION

Attention : il perd son efficacité sur BQ.1.1 !

> Evusheld doit être injecté à raison d'une **DOUBLE** dose tous les six mois (voie intra-musculaire).



3. VOUS AVEZ LE COVID ?

Recevez un traitement curatif :

- Paxlovid (traitement oral pendant cinq jours), qui nécessite souvent une adaptation temporaire des autres traitements
- Remdesivir (traitement intra-veineux pendant trois jours)

➔ Ces médicaments doivent être administrés le plus rapidement possible après les premiers symptômes.

➔ Insistez pour être traité sans délai !

➔ **Ces deux médicaments sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale sévère (fonction rénale < 30 mL/min/1,73 m²).**



ISOLEZ-VOUS !

PORTEZ UN MASQUE FFP2 !

dans les lieux clos et fréquentés.

Ce masque doit être parfaitement ajusté.

Respectez les gestes barrières.

> **AÉREZ !**

