

Mise à jour du 28 novembre 2022 : Evusheld ne fonctionne pas sur le variant BQ.1.1, qui progresse fortement en France et est déjà majoritaire dans certaines régions.

PROTEGEZ-VOUS DU COVID, FACE AU VARIANT BQ.1.1

Nos conseils pour les personnes sévèrement immunodéprimées

1. SOYEZ À JOUR DE VOS RAPPELS

Un rappel de vaccin bivalent est recommandé :

- 3 mois après la dernière injection ou après une infection
- quel que soit le nombre de doses reçues auparavant.



> **VOS PROCHES DOIVENT AUSSI RECEVOIR CE RAPPEL**
dès 6 mois après leur dernière injection.



Ni une sérologie
ni une ordonnance
ne sont nécessaires
pour recevoir ce
nouveau rappel

OBTENIR UN RDV DE RAPPEL
Après de votre pharmacien, de
votre médecin généraliste, etc.

2. RECEVEZ EVUSHELD EN PRÉVENTION

Evusheld reste efficace sur beaucoup des variants qui circulent encore et pourrait aussi l'être sur de futurs variants. Il ne fonctionne plus sur BQ.1.1

> Evusheld doit être injecté à raison d'une **DOUBLE** dose tous les six mois (voie intra-musculaire).

On peut avoir un taux d'anticorps très élevé sans pour autant être protégé.



Testez-vous sans attendre en cas de symptôme !

Nez qui coule, toux, fatigue anormale, maux de tête, etc.

3. VOUS AVEZ LE COVID ?

Recevez un traitement curatif :

- Paxlovid (traitement oral pendant cinq jours), qui nécessite souvent une adaptation temporaire des autres traitements et qui est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère (fonction rénale < 30 mL/min/1,73 m²).
- Remdesivir (traitement intra-veineux pendant trois jours)
- Ces médicaments doivent être administrés le plus rapidement possible après les premiers symptômes.
- Insistez pour être traité sans délai !



PORTEZ UN MASQUE FFP2 !

dans les lieux clos et fréquentés.

Ce masque doit être parfaitement ajusté.

Évitez les foules. Respectez les gestes barrières.

Suggérez à vos familles / amis de faire un test avant les moments de convivialité.



> **AÉREZ !**